

# Oreionul

Oreionul este o boală infecțioasă cauzată de un virus. De obicei, nu este gravă, însă în anumite cazuri poate duce la complicații serioase.

## Răspândirea oreionului

Oreionul se transmite prin tuse și strănut.

Virusul poate fi inhalat prin respirație sau poate fi luat de pe suprafețe infectate.

O persoană cu oreion este mai contagioasă cu câteva zile înainte de apariția simptomelor și pentru câteva zile după aceea.

## Simptomele oreionului



inflamarea  
obrajilor



durere  
la înghițire



febră



dureri de cap



dureri musculare

Cel mai frecvent simptom al oreionului este o umflătură dureroasă în partea laterală a feței, sub urechi. Alte simptome includ senzația de rău, gură uscată, dureri de burtă, senzație de oboseală și pierderea poftei de mâncare. În caz de infecție cu oreion, nu vă veți simți bine timp de 1 - 2 săptămâni. Nu există tratament sau leac pentru oreion.

Dacă sunteți de părere că ați putea avea oreion, este important să sunați la cabinetul medicului de familie.

Va trebui să stați departe de alte persoane pentru a evita răspândirea bolii.

## Posibile complicații



testicule sau  
ovare inflamate



pierderea auzului



meningită



pancreatită




encefalită


## Statistici despre oreion

1 din 4 băieți și bărbați adolescenți care se îmbolnăvesc de oreion au testiculele umflate.

Sub jumătate dintre cei afectați observă o oarecare contracție a testiculelor după aceea.



1 din 10 bărbați înregistrează o scădere a numărului de spermatozoizi (cantitatea de spermatozoizi sănătoși pe care organismul lor o poate produce) după infecția cu oreion.



1 din 1.000 de cazuri de oreion duce la o infecție cerebrală care, în cazuri rare, poate fi fatală.



## Prevenirea oreionului

Vaccinarea ROR este singura modalitate de a preveni oreionul.

Toate persoanele au nevoie de două doze de vaccin ROR, administrate în mod ideal la vârsta de 1 an și la 3 ani și 4 luni. Vaccinul ROR protejează, de asemenea, împotriva rujeolei și rubeolei.

Vaccinul ROR este foarte eficient. După 2 doze, 88% dintre persoane vor fi protejate împotriva oreionului.

Vaccinul este gratuit pentru oricine. Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră ați omis o doză, contactați cabinetul medicului dumneavoastră de familie pentru a recupera doza. Nu există o limită de vârstă pentru vaccinare.

**Prima doză la 1 an**



**A doua doză la  
3 ani și  
4 luni**



### Mai multe despre oreion



(nhs.uk)



(ox.ac.uk)

### Mai multe despre vaccinul ROR



(nhs.uk)

Acesta nu este un instrument de diagnostic. Dacă sunteți de părere că ar putea avea oreion copilul dumneavoastră, sunați imediat la cabinetul medicului de familie sau la numărul 111.

Dezvoltat de NHS North Central London Integrated Care Board.