

# Vaksinat për fëmijët dhe ku t'i merrni

8 javë



- ★ 6 në 1 (difteria, tetanosi, kolla e mirë, poliomieliti, HIB, hepatiti B)
- ★ Meningokoku B
- ★ Rotavirusi (pika nga goja)

12 javë



- ★ 6 në 1 (difteria, tetanosi, kolla e mirë, poliomieliti, HIB, hepatiti B)
- ★ Pneumokoku
- ★ Rotavirusi (pika nga goja)

16 javë



- ★ 6 në 1 (difteria, tetanosi, kolla e mirë, poliomieliti, HIB, hepatiti B)
- ★ Meningokoku B

1 vit



- ★ HIB/meningokoku C
- ★ MMR (fruthi, shytat, rubeola)
- ★ Pneumokoku
- ★ Meningokoku B

3 vjet  
4 Muaj



- ★ 4 në 1 (difteria, tetanosi, kolla e mirë, poliomieliti)
- ★ MMR (fruthi, shytat, rubeola)

Marrja e vaksinave në kohë është mbrojtja më e mirë. Nëse fëmija juaj nuk e kryen një dozë, kontaktoni mjekun e përgjithshëm për ta kryer. Për t'u mbrojtur plotësisht, fëmijës i duhen të gjitha dozat e treguara.

## Keni pyetje për vaksinimin?

Pyesni mjekun e përgjithshëm, infermieren, asistentin shëndetësor ose farmacistin.

Skanoni për të mësuar më shumë

