

تطعيمات الأطفال ومتى يجب الحصول عليها

8 أسابيع



6 في 1 (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال
والمستدمية النزلية والتهاب الكبد الوبائي ب)
التهاب السحايا ب
فيروس الروتا (قطرات للابتلاع)

12 أسابيع



6 في 1 (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال
والمستدمية النزلية والتهاب الكبد الوبائي ب)
المكورات الرئوية
فيروس الروتا (قطرات للابتلاع)

16 أسابيع



6 في 1 (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال
والمستدمية النزلية والتهاب الكبد الوبائي ب)
التهاب السحايا ب

سنة



المستدمية النزلية من النوع ب/لقاح المكورات السحائية
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية
المكورات الرئوية
التهاب السحايا ب

3 سنوات
4 أشهر



4 في 1 (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال)
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية

الحصول على اللقاحات في الوقت المحدد يعطي أفضل حماية. إذا فاتت طفلك جرعة ما، اتصل بالطبيب العام لتلقي الجرعة الفائتة. لكي يتمتع طفلك بالحماية الكاملة، يحتاج إلى جميع الجرعات الموضحة.



قم بالمسح
الضوئي
لمعرفة المزيد

هل لديك أسئلة عن التطعيمات؟
اسأل الطبيب العام أو الممرضة أو الزائر الصحي أو الصيدلي.