

# শৈশবকালীন টিকা এবং কখন সেগুলি নিতে হবে

8 সপ্তাহ



- ★ 1-এর মধ্যে-6 (ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, ছুপিং কাশি, পোলিও, হিব, হেপাটাইটিস B)
- ★ মেনবি (MenB)
- ★ রোটাভাইরাস (গিলে ফেলার জন্য ফোঁটা)

12 সপ্তাহ



- ★ 1-এর মধ্যে-6 (ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, ছুপিং কাশি, পোলিও, হিব, হেপাটাইটিস B)
- ★ নিউমোকোকাল
- ★ রোটাভাইরাস (গিলে ফেলার জন্য ফোঁটা)

16 সপ্তাহ



- ★ 1-এর মধ্যে-6 (ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, ছুপিং কাশি, পোলিও, হিব, হেপাটাইটিস B)
- ★ মেনবি (MenB)

1 বছর



- ★ হিব/মেনসি (MenC)
- ★ MMR (হাম, মাম্পস, রুবেলা)
- ★ নিউমোকোকাল
- ★ মেনবি (MenB)

3 বছর  
4 মাস



- ★ 1-এর মধ্যে-4 (ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, ছুপিং কাশি, পোলিও)
- ★ MMR (হাম, মাম্পস, রুবেলা)

সময়মতো ভ্যাকসিন নিলে সর্বোত্তম সুরক্ষা পাওয়া যায়। আপনার সন্তান কোনো ডোজ মিস করে থাকলে ক্যাচ আপ করার জন্য তার GP-এর সাথে যোগাযোগ করুন। সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকার জন্য, আপনার সন্তানের দেখানো সমস্ত ডোজ প্রয়োজন।

**টিকা নিয়ে প্রশ্ন আছে?**

আপনার GP, নার্স, স্বাস্থ্য পরিদর্শক বা ফার্মাসিস্টকে জিজ্ঞাসা করুন।

আরও  
জানতে  
স্ক্যান করুন

