

# Vaccinările pentru copii și când să le faceți

8 săptămâni



- ★ 6 în 1 (difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, Hib, hepatită B)
- ★ MenB
- ★ Rotavirus (picături de înghițit)

12 săptămâni



- ★ 6 în 1 (difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, Hib, hepatită B)
- ★ Pneumococ
- ★ Rotavirus (picături de înghițit)

16 săptămâni



- ★ 6 în 1 (difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, Hib, hepatită B)
- ★ MenB

1 an



- ★ Hib/MenC
- ★ ROR (rujeolă, oreion, rubeolă)
- ★ Pneumococ
- ★ MenB

3 ani  
4 luni



- ★ 4 în 1 (difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită)
- ★ ROR (rujeolă, oreion, rubeolă)

Vaccinarea la timp oferă cea mai bună protecție. În cazul în care copilul dumneavoastră a omis o doză, contactați cabinetul medicului dumneavoastră de familie pentru a recupera doza. Pentru a fi pe deplin protejat, copilul dumneavoastră are nevoie de toate dozele indicate.

## Aveți întrebări despre vaccinări?

Adresați-vă medicului dumneavoastră de familie, asistentei medicale, vizitatorului medical sau farmacistului.

Scanați  
pentru a afla  
mai multe

