

Çocukluk aşıları ve ne zaman yaptırılmaları gerektiği

8 Hafta



- ★ 6'sı 1 arada (Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Polio, Hib, Hepatit B)
- ★ MenB
- ★ Rotavirüs (yutmak için damlalar)

12 Hafta



- ★ 6'sı 1 arada (Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Polio, Hib, Hepatit B)
- ★ Pnömonokok
- ★ Rotavirüs (yutmak için damlalar)

16 Hafta



- ★ 6'sı 1 arada (Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Polio, Hib, Hepatit B)
- ★ MenB

1 Yıl



- ★ Hib/MenC
- ★ KKK (Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık)
- ★ Pnömonokok
- ★ MenB

3 Yıl
4 Ay



- ★ 4'ü 1 arada (Difteri, Tetanoz, Boğmaca, Polio)
- ★ KKK (Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık)

Aşıları zamanında yaptırmak en iyi korumayı sağlar. Çocuğunuz bir dozu kaçırırsa telafi etmek için aile hekimliğine başvurun. Tam koruma için çocuğunuzun belirtilen tüm dozlara ihtiyacı vardır.

Aşılarla ilgili sorularınız mı var?

Aile hekiminize, hemşirenize, sağlık danışmanınıza veya eczacınıza sorun.

Daha fazla
bilgi için
tarayın

